

## 唐氏综合征产前筛查申请单

送检医院:\_\_\_\_\_ 取样时间:\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日 采集医生\_\_\_\_\_

姓名:\_\_\_\_\_ 孕妇出生日期(阳历):\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

体重:\_\_\_\_\_KG 末次月经:\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

手机:\_\_\_\_\_

胰岛素依赖性糖尿病: 是 否 吸烟: 否 是\_\_\_\_\_年\_\_\_\_支/天

怀孕前已停止吸烟

怀孕期间停止吸烟

孕产史: 孕\_\_\_\_\_产\_\_\_\_\_

异常妊娠史: 21-三体 18-三体 开放性神经管缺陷 其他\_\_\_\_\_

本次妊娠性质: 自然

促排 供卵 供精 IVF ICSI GIFT ZIFE 其他

取卵日期:\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日 植入日期:\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

单胎日期: 双胎妊娠 单卵双生

双卵双生

筛查孕周:\_\_\_\_\_周

确定孕周方式: 月经 规则 不规则 月经周期:\_\_\_\_\_天

### 检查须知:

- 1、通过筛查得出胎儿患21-三体、18-三体和开放性神经管缺陷的风险度,是一种无创伤的检查,但并不是确诊检查。
- 2、鉴于当今医学技术水平的限制和孕妇个体差异或有些已知和无法预知的原因,即使在医务人员已认真履行了工作职责和严格执行操作规程的情况下,该项检查仍有局限性,预期检出率为:孕中期开放性神经管缺陷:85-90%;21-三体:60-70%;18-三体60-70%。
- 3、检查时间为孕15-20周,其中孕17周为最佳检查时间。
- 4、现有风险评估数据主要基于自然受孕的单胎人群,双胎或接受辅助生殖技术可影响母血清中标志物的浓度,将导致对21-三体、18-三体和开放性神经管缺陷风险度评估不准确,检出率下降。